

Diplopie (Doppelbilder)



Orthoptik

Diplopie

Monokulare Diplopie

Wenn beim Abdecken eines Auges Diplopie bestehen bleibt, suchen Sie bitte einen Augenfacharzt auf.

Monokulare Diplopie kann durch unkorrigierte Refraktionsfehler, Linsentrübung, Linsenverschiebung oder Netzhauterkrankungen verursacht werden.

Binokulare Diplopie

Wenn beim Abdecken eines Auges Einfachsehen möglich ist, vereinbaren Sie bitte einen Termin an der Orthoptik / Sehschule.



Ursachen für binokulare Diplopie

- dekompenziertes Schielen
- Augenmuskellähmungen (Paresen) durch neurologische bzw. vaskuläre Erkrankungen (Schlaganfall, Multiple Sklerose, Diabetes, ...)
- mechanische Augenbewegungsstörungen (nach Unfällen)
- Schilddrüsenerkrankungen (Endokrine Orbitopathie)
- Tumore, u. a.

Je nach orthoptischer Diagnose ist eventuell eine weitere neurologische / radiologische / internistische / nuklearmedizinische Abklärung zur Feststellung der Ursache notwendig.

Therapie

- Versorgung mit Prismenfolie bzw. Prismenbrille zum Ausgleich der Doppelbilder
- Versorgung mit Okklusionsfolie zur Vermeidung der Doppelbilder
- Augenmuskeloperation bei Bedarf

Bei Doppelbildern ist das Lenken eines Kraftfahrzeuges verboten!

Kontakt

Terminvereinbarung unter:

Telefon +43 7242 415 - 2293

Montag bis Freitag von 08:00 bis 15:30 Uhr

Bitte bringen Sie einen aktuellen Befund vom Augenfacharzt sowie eventuell vorhandene Sehbehelfe (Lupen, Brillen, etc.) mit.

nur mit Überweisung vom Augenfacharzt

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH

Eine Einrichtung der Kreuzschwestern und Franziskanerinnen

Abteilung für Augenheilkunde und Optometrie

Grieskirchner Straße 42, 4600 Wels, Austria,

Telefon +43 7242 415 - 2293, Fax DW 3934 post@klinikum-wegr.at

www.klinikum-wegr.at