

	Symptome/Verlauf	Wen betrifft es?	Behandlung
AKUT			
ALL Akute lymphatische Leukämie	aggressiv, beginnt plötzlich, rascher Verlauf	häufigste Krebsart bei Kindern	intensive Chemotherapie
AML Akute myeloische Leukämie	beginnt plötzlich, schreitet schnell voran	etwa die Hälfte der Betroffenen älter als 70	intensive Chemotherapie, bei älteren Patienten zur Krankheitskontrolle gut verträgliche Therapie mit hypomethylierenden Substanzen
CHRONISCH			
CLL Chronische lymphatische Leukämie	schleichender Verlauf, oftmals beschwerdefrei, zufällige Diagnose Anfangssymptome: Lymphdrüsenvergrößerungen ohne Schmerz	Achtung vor Infektionen bei Fernreisen, Lebendimpfstoffen und nicht pasteurisierten Milchprodukten	Chemoimmuntherapie, zielgerichtete Therapie
CML Chronische myeloische Leukämie	anfangs symptomloser, schleichender Verlauf, Diagnose meist im Rahmen von Routine-Blutuntersuchungen	mittleres Erkrankungsalter 50 bis 60, Bestätigung durch den Nachweis des sogenannten Philadelphia-Chromosoms bzw. des BCR-ABL-Gens	durch zielgerichtete Medikamente