

# Operationen des Ohres (Cochleaimplantation)

## Informationen und Verhaltensmaßnahmen

### Vor der Operation

- Ab Mitternacht des Operationstages dürfen Sie keine feste und flüssige Nahrung mehr zu sich nehmen.
- Die Aufnahme erfolgt am Tag der Operation. Ein Arzt erklärt Ihnen den Ablauf des Eingriffes und beantwortet alle Ihre diesbezüglichen Fragen.
- Anschließend erfolgt das Narkosegespräch.
- Das Pflegepersonal wird Sie über alle weiteren Maßnahmen in Kenntnis setzen (z. B. Rasur).

### Nach der Operation

- Nach der Cochleaimplantation sollten Sie in den ersten zwei Tagen nach der Operation nur in Begleitung des Pflegepersonals aufstehen.
- Bei Schwindel, Ohrgeräuschen oder Schmerzen melden Sie sich bitte beim Pflegepersonal.
- Nach erfolgter Operation tragen Sie einen Ohrverband. Dieser fängt blutiges Wundsekret auf und kann dadurch fleckig sein. Stärkere Blutungen nach Ohroperationen sind sehr selten. Bei Bedarf wird der Ohrverband gewechselt.
- Nach der Operation kann es zu Schmerzen kommen. Es handelt sich dabei vor allem um Wundschmerzen. Bitte melden Sie das Auftreten von Schmerzen dem Pflegepersonal, damit Ihnen ein Schmerzmittel verabreicht werden kann.
- Achten Sie darauf, dass der Verband trocken bleibt!
- Nach der Operation besteht Schnäuzverbot für die ersten Tage. Starkes Pressen, tiefes Bücken sollten in den ersten zwei Wochen unterbleiben. Weiters sollte das Heben von Lasten über 5 Kilo in den ersten beiden postoperativen Wochen unterbleiben.

### Nach Entlassung

- In der Regel erfolgt die Entlassung aus der stationären Pflege zwei bis vier Tage nach dem Eingriff. Sie erhalten bei der Entlassung den Arztbrief, welchem Sie bitte den Termin zur ambulanten Kontrolle entnehmen, sowie den Termin zur Erstanpassung des Sprachprozessors.
- Halten Sie das operierte Ohr weiterhin trocken!
- Nicht Rauchen (Tabakkonsum verschlechtert die Wundheilung massiv).
- Nach der Cochleaimplantation sollten 8 Wochen keine Flugreisen unternommen werden.
- Die Nahtentfernung wird um den zehnten postoperativen Tag erfolgen, bis dahin werden individuell Verbandwechsel durchgeführt.
- Sollten Sie auf dem operierten Ohr ein Hörgerät tragen, empfehlen wir eine Tragepause von zwei bis drei Wochen.
- Bei neu aufgetretenen Schmerzen, Fieber, Schwindel oder anderen Auffälligkeiten ist eine jederzeitige Kontrolle an der HNO-Ambulanz möglich.
- Bei neu aufgetretenen Schmerzen, Fieber, Schwindel oder anderen Auffälligkeiten ist eine jederzeitige Kontrolle an der HNO-Ambulanz möglich.

---

#### Abteilung für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Leitung: Prim. Dr. Thomas Keintzel

Grieskirchner Straße 42, 4600 Wels

Telefon +43 7242 415 - 2313

hno@klinikum-wegr.at, www.klinikum-wegr.at

**Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH**

Eine Einrichtung der Kreuzschwestern

und Franziskanerinnen